
Paracetamol en pediatría



El paracetamol es un principio activo indicado en el dolor y [la fiebre](#). Es un medicamento muy utilizado en pediatría.

La **dosis recomendada** de paracetamol se calcula **en función del peso** de la niña o niño. Y no en función de su edad.

Esta ficha sobre el uso del paracetamol en pediatría puede ser muy útil.

Procede de [i-botika](#) - *Información ciudadana sobre medicamentos*.

i-botika es una iniciativa impulsada por el *Departamento de Salud del Gobierno Vasco*, desde donde podrás acceder a información clara, independiente y útil sobre medicamentos.

Esta es la Ficha que corresponde al uso del **Paracetamol en pediatría** (pincha en la imagen para descargarte el pdf):

MEDICAMENTOS EN PEDIATRÍA: ¡NO ES UN JUEGO!

JARABE DE PARACETAMOL, en su justa medida

El **paracetamol** es un principio activo indicado en el **dolor** y la **fiebre**. Es un medicamento muy utilizado en pediatría.



Es eficaz...
Es seguro...
... siempre que se tome
a la **DOSIS ADECUADA**

¿CÓMO PUEDO CONOCER LA DOSIS ADECUADA PARA MI HIJA/O?

La **dosis diaria recomendada** de paracetamol se calcula en función del peso de la niña o niño. Para un **jarabe de paracetamol de 100 mg/ml** (lo más común en el mercado), la tabla de dosificación es:

| Peso | Paracetamol (cada 6 horas) | Peso | Paracetamol (cada 6 horas) | Peso | Paracetamol (cada 6 horas) |
|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|
| 4 kg | 0,6 ml | 14 kg | 2,1 ml | 24 kg | 3,6 ml |
| 5 kg | 0,8 ml | 15 kg | 2,3 ml | 25 kg | 3,8 ml |
| 6 kg | 0,9 ml | 16 kg | 2,4 ml | 26 kg | 3,9 ml |
| 7 kg | 1,1 ml | 17 kg | 2,6 ml | 27 kg | 4,1 ml |
| 8 kg | 1,2 ml | 18 kg | 2,7 ml | 28 kg | 4,2 ml |
| 9 kg | 1,4 ml | 19 kg | 2,9 ml | 29 kg | 4,4 ml |
| 10 kg | 1,5 ml | 20 kg | 3,0 ml | 30 kg | 4,5 ml |
| 11 kg | 1,7 ml | 21 kg | 3,2 ml | 31 kg | 4,7 ml |
| 12 kg | 1,8 ml | 22 kg | 3,3 ml | 32 kg | 4,8 ml |
| 13 kg | 2,0 ml | 23 kg | 3,5 ml | 33 kg | 5,0 ml |

- ✓ A partir de 34 kilos, se pueden usar comprimidos de paracetamol de 500 mg.
- ✓ Si no se tolera el jarabe, se pueden utilizar supositorios de paracetamol como alternativa.
- ✓ Los jarabes de paracetamol siempre traen en la caja un cuentagotas o una jeringa. Todos ellos son adecuados para medir la dosis.

CÓMO EVITAR ERRORES

FÍJATE BIEN EN LA ESCALA USADA PARA MEDIR LA DOSIS DE MEDICAMENTO

Hay jeringas que miden solo en mililitros (ml) y otras que lo hacen en mililitros y además en kilos (kg). **No confundas las escalas.**



ACOSTÚMBRATE a usar cada jarabe con su jeringa. No intercambies las de jarabes diferentes.

 Si aún tienes dudas, consulta con el personal sanitario de tu centro de salud o farmacia o lee el prospecto.

Palabras clave:

[fiebre](#)

[paracetamol](#)

Recursos relacionados:

Decálogo de la fiebre

La fiebre: ¿qué es?

