

---

## Antieméticos (para los vómitos)

### ¿Qué son?

Son medicamentos que se usan para el tratamiento de los vómitos.

### ¿Para qué se utilizan?

Para tratar enfermedades en las que el niño vomita.

### ¿Cómo se utilizan?

Se suelen usar en jarabe. Si el niño vomita el jarabe, se pueden usar en láminas bucodispersables (se disuelven en la boca), en supositorio o inyectados.

### ¿Cuándo se utilizan?

Ha de ser siempre el pediatra el que nos diga cuando hay que usarlos.

Los [vómitos](#) en los niños pueden aparecer por causas muy diferentes. Unas pueden ser de poca importancia y otras pueden ser más graves.

**La mayoría de las veces no hay que usar medicinas para los vómitos y pueden dar problemas si se usan mal.** No es aconsejable usarlos por nuestra cuenta. Hay que tratar la causa que los origina.

Muchas diarreas se acompañan de vómitos y fiebre ([gastroenteritis aguda](#)) y puede haber riesgo de [deshidratación](#). Sobre todo en niños muy pequeños. En estos casos será importante iniciar una pauta de [rehidratación oral](#) dando un suero a cantidades muy pequeñas y de poco en poco. A pesar de algunos beneficios con los antieméticos, en estos casos no se aconseja su uso por sus posibles efectos no deseados. Si el cuadro se agrava, puede que en las urgencias del hospital los utilicen en gotero para frenar los vómitos.

A veces, pueden ser necesarios en: postoperatorios, quimioterapia, [enfermedad por reflujo gastroesofágico](#) o alteraciones de la motilidad intestinal. En todos estos casos será el pediatra quién recomiende su uso.

### ¿Cuales son los más utilizados?

- Metoclopramida (*Primperan*®): No se aconseja su uso en menores de 18 años por sus efectos no deseados (espasmos de los músculos del cuello, de la cara y de la lengua, problemas de coordinación e imposibilidad de quedarse quieto,...).

- Domperidona (*Motilium*®): Usar sólo si se lo aconseja el pediatra. A la menor dosis que sea eficaz. Y durante el mínimo tiempo posible.

- Ondansetron (*Zofran*®, *SetoFilm*®): Parece el más eficaz y más seguro. Se usa después de cirugía, durante la quimioterapia en niños con cáncer o en casos con gastroenteritis graves.

---

**Fecha de publicación:** 17-07-2013

*Última fecha de actualización:* 24-05-2016

**Autor/es:**

- [Pilar Lalana Josa](#). Pediatra. Centro de Salud "San José Centro". Zaragoza
- [Blanca Laclaustra Mendizábal](#). Pediatra. Centro de Salud "San José Norte". Zaragoza

